

호남권 감염병 감시 주간소식지

2026년 10주차(2026.3.1.-3.7.)


※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계

▶ 10주 주요 감염병 ◀


□ 전수감시 주요 감염병

* 감염병 발생 규모와 양상을 고려하여 선정

- 결핵 30명 발생으로 전주 대비 16.7% 감소하였으며, 전국 대비 인구10만명당발생률 1.2배 높음
- 성홍열 13명 발생하였으며, 최근 5년 평균 대비 높은 발생 및 전년 대비 130.8% 증가




<결핵 발생 현황>




<성홍열 발생 현황>

□ 표본감시 주요 감염병

- 인플루엔자 감시(의원급 외래환자 기준)
 - 의사환자(ILI) 분율 의원급 외래 환자 1,000명당 호남 21.0명, 전국 17.4명 전주 대비 모두 감소
 - 의사환자분율 지속 감소 추세이나 유행기준 대비 높은 발생, 세부아형으로는 주로 B형 바이러스




<의원급 의료기관 주별 인플루엔자 의사환자 분율>



<의원급 의료기관 주별 인플루엔자 바이러스 아형 검출 현황(전국)>

- 전국 급성호흡기감염증 감시(병원급 입원환자 기준)

- (바이러스) 호흡기세포융합바이러스(35.4%), 사람코로나바이러스(17.8%), 리노바이러스(12.4%) 발생
- (세균) 마이코플라스마 폐렴균(87.5%), 클라미디아 폐렴균(12.5%) 발생



<병원급 의료기관 바이러스성, 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 현황(전국)>

1 호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 10주차)

감염병	주간(2026.3.1~2026.3.7)											연간 누계(2025.12.28~2026.3.7)																			
	전국		호남권		광주		전북		전남		제주		전국		호남권			광주			전북			전남			제주				
	10주	10주	9주	10주	9주	10주	9주	10주	9주	10주	9주	10주	9주	'26	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25
결핵	261	30	36	5	5	11	16	13	12	1	3	2,743	358	361	△0.8	52	50	4.0	129	112	15.2	151	162	△6.8	26	37	△29.7				
수두	327	37	43	11	20	14	13	8	3	4	7	4,843	708	714	△0.8	191	139	37.4	207	186	11.3	155	281	△44.8	155	108	43.5				
홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	△100.0	0	2	△100.0	0	0	-	0	2	△100.0	0	1	△100.0				
장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
세균성 이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-				
장출혈성 대장균감염증	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	39	8	4	100.0	4	3	33.3	0	0	-	1	1	0.0	3	0	순증				
A형간염	27	7	4	1	0	3	2	3	2	0	0	246	60	45	33.3	2	7	△71.4	27	21	28.6	27	9	200.0	4	8	△50.0				
백일해	9	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	103	16	436	△96.3	3	95	△96.8	2	112	△98.2	10	163	△93.9	1	66	△98.5				
유형성이하선염	70	7	8	1	4	3	1	2	3	1	0	759	84	122	△31.1	24	36	△33.3	25	32	△21.9	20	39	△48.7	15	15	0.0				
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
수막구균	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	△100.0	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
폐렴구균감염증	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	85	7	15	△53.3	2	2	0.0	1	3	△66.7	1	7	△85.7	3	3	0.0				
성홍열	116	13	19	6	14	3	0	4	4	0	1	2,380	277	120	130.8	149	41	263.4	34	21	61.9	69	46	50.0	25	12	108.3				
VRSA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
CRE†	801	72	98	31	32	25	44	13	16	3	6	9,916	935	798	17.2	238	225	5.8	391	300	30.3	245	206	18.9	61	67	△9.0				
E형간염	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	110	10	20	△50.0	3	6	△50.0	2	8	△75.0	5	5	0.0	0	1	△100.0				
파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-				
B형간염	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	35	5	7	△28.6	2	1	100.0	1	1	0.0	2	4	△50.0	0	1	△100.0				
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
C형간염	72	8	11	0	3	0	5	8	3	0	0	903	128	154	△16.9	32	34	△5.9	25	46	△45.7	63	64	△1.6	8	10	△20.0				
말라리아	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	△100.0	0	0	-	0	1	△100.0	0	1	△100.0	0	0	-				
레지오넬라증	5	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	150	8	6	33.3	0	1	△100.0	3	0	순증	3	2	50.0	2	3	△33.3				
비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
쯔쯔가무시증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	7	20	△65.0	0	0	-	4	4	0.0	1	12	△91.7	2	4	△50.0				
렘트스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	△50.0	0	1	△100.0	1	0	순증	0	1	△100.0	0	0	-				
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-				
신증후군출혈열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	13	△69.2	1	2	△50.0	0	4	△100.0	3	6	△50.0	0	1	△100.0				
CJD, 변종CJD*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-				
댕기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	3	△66.7	0	0	-	0	0	-	0	3	△100.0	1	0	순증				
큐열	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
라임병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
치쿤구니야열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
SFTS*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
지카바이러스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
매독	39	1	4	0	1	0	3	1	0	0	0	358	21	32	△34.4	4	7	△42.9	9	11	△18.2	5	9	△44.4	3	5	△40.0				
엡폭스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				

* : 2급감염병, 3급감염병, 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
 ** 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외
 † VRSA: 반코마이신내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균속 감염증, CJD: 크로이츠펠트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군

2 호남권 주요 감염병 발생 현황(2026년 10주차)

※ 주요 감염병: 결핵, 수두, 유행성이하선염, 성홍열, CRE, SFTS, 쯤쯤가무시증, B형간염, C형간염

□ 주간 발생 추이

○ (전주 대비 증가) 해당없음

○ (전년 동기간 대비 증가) **성홍열 ▲157명(130.8%)^①, CRE ▲157명(17.2%)^②**


① ('19년)203명 → ('22년)11명 → ('24년)29명 → ('25년)120명 → ('26년)277명

② ('19년)198명 → ('22년)378명 → ('24년)737명 → ('25년)798명 → ('26년)935명

□ 주간 발생 현황

○ (10주) 총 179명, CRE 72명, 수두 37명, 결핵 30명 순

○ (누적) 총 2,639명, CRE 935명, 수두 708명, 결핵 358명 순













- (발생률) 쯤쯤가무시증^{2.6배}, 수두^{1.3배}, 결핵·C형간염^{1.2배} 전국대비 발생률 높음

< 전국·호남권 주요감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-10주) >

감염병	전국	호남권	광주	전북	전남	제주	
2급	결핵	5.36	6.41	3.71	7.45	8.46	3.89
	수두	9.47	12.68	13.64	11.95	8.69	23.22
	유행성이하선염	1.48	1.50	1.71	1.44	1.12	2.25
	성홍열	4.65	4.96	10.64	1.96	3.87	3.74
	CRE	19.38	16.75	17.00	22.58	13.73	9.14
3급	SFTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	쯤쯤가무시증	0.05	0.13	0.00	0.23	0.06	0.30
	B형간염	0.07	0.09	0.14	0.06	0.11	0.00
	C형간염	1.76	2.29	2.29	1.44	3.53	1.20

□ 주요 감염병 발생 추이



3 표본감시 주요 감염병 발생 현황(2026년 10주차)


※ 호남권 표본감시는 참여 기관 수가 적어 통계적 대표성이 확보되지 않아 참고용으로 활용

□ **인플루엔자 환자감시** ※ 표본감시기관: (의원급) 전국 294개, 호남 33개, (병원급 이상) 전국 222개, 호남 31개

○ **(의원급 의사환자) 의사환자분율(ILI) 1,000명당 호남 21.0명, 전국 17.4명**

- 연령별로는 7~12세(호남 65.6명/전국 55.8명), 1~6세(호남 38.8명/전국 30.0명) 순으로 발생


전국 의원급 연령별, 주별 인플루엔자 의사환자분율




○ **(병원급 입원환자) 입원환자 호남 12명(10.4%), 전국 115명 전주 대비 모두 감소 하였으며, '26년 누적 총 호남 433명, 전국 3,563명**

- 연령별로는 1~6세(호남 5명/전국 20명), 65세이상(호남 4명/전국 53명) 순으로 발생

병원급 인플루엔자 입원환자 수



전국 병원급 인플루엔자 입원환자 연도별, 연령별 현황



- (세균성) 살모넬라균 50명, 캄필로박터균 35명, 병원성대장균 18명 순

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- (바이러스성) △노로바이러스 301명으로 최근 5주 연속 감소, △그룹 A형 로타바이러스 135명 순


전국 바이러스성 장관감염증 신고현황



○ 주요 장관감염증

- (노로바이러스) 신고환자 호남 34명(11.3%), 전국 301명 전주 대비 모두 감소하였으며, '26년 누적 총 호남 588명, 전국 5,332명

노로바이러스



붙임1 주의해야 할 감염병 - 인플루엔자

구분	내용
정의	□ 인플루엔자바이러스(<i>Influenzavirus A·B·C·D</i>) 감염에 의한 급성호흡기질환
질병분류	□ KCD-10 J10.0~11.8
병원체	□ 인플루엔자바이러스
전파경로	□ 감염된 환자의 호흡기로부터 비말(droplet)로 전파
호발대상	□ 전 연령대 발생
잠복기	□ 50대 이상
감염력	□ 증상시작 1일전부터 발병 후 5~7일까지 □ 단, 소아나 면역저하자에서는 바이러스 배출기간이 10일 이상 길어지기도 함
주요증상	□ 고열(38~40°C), 마른기침, 인후통 등 호흡기 증상과 두통 근육통, 피로감, 쇠약감, 식욕부진 등 전신증상을 보임 □ 그 외에도 콧물, 코막힘, 안구통, 구토, 복통 등이 동반될 수 있음 □ 대부분 경증으로 자연 치유되지만 노인, 영유아, 만성질환자, 임신부 등은 합병증 발생 또는 기저질환의 악화로 입원치료를 받을 수 있고 일부는 사망에 이를 수 있음
합병증	□ 부비동염, 중이염 등 상부호흡기 감염증이 흔함 □ 모세기관지염, 기관지염, 폐렴 등 하부호흡기 감염증, 신경계 합병증(뇌염, 척수염, 길랑-바레 증후군), 횡단성 척수염, 심근염, 근육염(횡문근 용해증), 기흉 등이 발생 가능함
진단을 위한 검사기준	□ 검체(구인두도말, 비인두도말, 비인두흡인물, 비강흡인물, 기관지폐포세척액, 가래)에서 특이 유전자 검출
치료	□ 대증요법 □ 항바이러스제 치료
사망	□ 매년 약 290,000~650,000명의 인플루엔자 관련 호흡기 사망 발생(WHO) ¹⁾
예방	□ 예방접종 □ 일반적 예방 - 올바른 손씻기 · 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 기침 예절 · 호흡기 증상이 있을 때는 마스크 착용 · 기침이나 재채기할 때는 휴지나 옷소매 위로 입과 코를 가리고 하기 · 기침 후에는 반드시 올바른 손씻기, 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기 - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등을 만지지 않기 - 호흡기 증상자와 접촉 피하기 - 주위 표면과 물체 청소와 소독하기

1) WHO Influenza Factsheet, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal))

붙임2 주의해야 할 감염병 - 호흡기세포융합바이러스감염증

구분	내용
정의	<ul style="list-style-type: none"> 호흡기세포융합바이러스(RSV, Respiratory syncytial virus) 감염에 의한 급성호흡기감염증
질병분류	<ul style="list-style-type: none"> 법정감염병(제4급) 질병코드: J02.8 & B97.4, J03.80 & B97.4, J03.81 & B97.4, J12.1, J20.5, J21.0
병원체	<ul style="list-style-type: none"> 뉴모비리데과(<i>Pneumoviridae Orthopneumovirus</i>)에 속하는 사람호흡기세포융합바이러스(<i>RSV, human respiratory syncytial virus</i>)
전파경로	<ul style="list-style-type: none"> 감염된 사람의 분비물과 직접 접촉 또는 호흡기 비말 전파
잠복기	<ul style="list-style-type: none"> 2~8일 (평균 4~6일)
신고범위	<ul style="list-style-type: none"> 환자: 호흡기세포융합바이러스 감염증에 부합되는 임상증상을 나타내면서 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병병원체 감염이 확인된 사람
진단을 위한 검사기준	<ul style="list-style-type: none"> 검체(구인두도말, 비인두도말, 비강흡인물, 비인두흡인물, 기관지폐포세척액, 가래 등)에서 특이 유전자 검출
증상	<ul style="list-style-type: none"> 코물, 인후통, 기침, 가래가 흔하며, 코막힘, 쉼 목소리, 천명(쌩쌩거림), 구토도 가능 성인에서는 감기 정도로 경미한 증상(주로 상기도 감염)을, 영유아에서는 모세기관지염, 폐렴 등 하기도 감염 가능하며, 신생아기에는 흔히 폐렴을 일으킴 호흡기 이외의 중증 증상으로 경련, 부정맥, 저나트륨 혈증, 신경학적 합병증 등
치료	<ul style="list-style-type: none"> 특이적인 항바이러스제 없음(면역저하자에서 Ribavirin 투여 가능) 대증 치료: 수액공급, 해열제 등 보존적인 치료, 고위험요소를 가지고 있을 경우 평가에 따라 산소치료 또는 입원치료
점염기간	<ul style="list-style-type: none"> 바이러스는 증상이 나타나기 수일 전부터 배출 될 수 있음 증상발생 후 약 10주간 바이러스 배출 지속
치명률	<ul style="list-style-type: none"> 대부분 자연 회복 고위험군: 선천심장 기형아, 조산아, 개심술 직후의 소아(특히 면역저하 환자(골수이식 또는 고형장기 이식환자 등)에서 RSV 폐렴 발생 시, 사망률이 50%이상 이를 수 있음)
관리	<p>< 환자관리 ></p> <ul style="list-style-type: none"> 표준주의 및 접촉주의 준수 영유아 및 면역저하자에서 RSV감염증이 있는 경우 접촉주의, 비말주의 준수 증상이 있는 동안 가급적 집에서 휴식을 취하고 다른 사람과 접촉을 피하도록 권고 <p>< 접촉자 관리 ></p> <ul style="list-style-type: none"> 감염증상 발생 여부 관찰
예방	<ul style="list-style-type: none"> 올바른 손씻기 <ul style="list-style-type: none"> - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 외출 후, 배변 후, 식사 전·후, 기저귀 교체 전·후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후 등 실시 기침 예절 준수 <ul style="list-style-type: none"> - 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기 - 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용 □ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기 <p>※ 예방항체 주사</p> <ul style="list-style-type: none"> - RSV로 인한 하기도질환 예방으로 팔리비주맙(Palivizumab), 니르세비맙(Nirsevimab) 투여



대상

- 어린이**
2012. 1. 1. ~ 2025. 8. 31. 출생자
- 임신부**
임신이 확인된 사람
- 65세 이상**
1960. 12. 31. 이전 출생자

일정

- 어린이** | 2회 접종 대상자 | 9. 22.(월)~
1회 접종 대상자 | 9. 29.(월)~
- 임신부** | 9. 29.(월)~
- 65세 이상** | 75세 이상 | 10. 15.(수)~
70~74세 | 10. 20.(월)~
65~69세 | 10. 22.(수)~

→ 2026년 4월 30일까지 시행

백신

3가 백신 1회 접종
단, 6개월 ~ 9세 미만 어린이 중 과거 접종력이 없거나, 기존에 1회만 접종받은 자는 2회 접종

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소
단, 접종 가능 여부는 반드시 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 사전 확인 필요

이런 분들은 예방접종을 해서는 안 됩니다!

- ☑ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☑ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우



이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ☑ 인플루엔자 예방접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ☑ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기

예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☑ 국소 이상반응: 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ☑ 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등



예방접종 후 이상반응이 생기면

- ☑ 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- ☑ 다만 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다

참고 이달의 건강소식_봄철 새학기 유행성 감염병

2026.2.26. 질병관리청

이달의 건강소식
따뜻해진 날씨에도 방심은 금물!
봄철 새 학기 유행성 감염병

CH 대한민국 질병관리청 친구 추가

유행하는 감염병은?
주의해야 할 사항은?

1/7

2026.2.26. 질병관리청

이달의 건강소식 **봄철 새 학기 유행성 감염병**

☹️ **주의해야 할 '봄철 새 학기 유행성 감염병'은?**

최근 B형 인플루엔자 유행 증으로
각별한 주의가 필요합니다.

인플루엔자 이외에도 수두, 유행성이하선염(볼거리)은
대표적인 새 학기 유행성 감염병으로,
영·유아나 초등학교 저학년 어린이에서 발생률이 높으며
매년 4~6월, 10월~이듬해 1월 사이 발생이 증가합니다.

CH 카카오톡 채널 '대한민국 질병관리청' 친구 추가 2/7

2026.2.26. 질병관리청

이달의 건강소식 **봄철 새 학기 유행성 감염병**

☹️ **봄철 새 학기 유행성 감염병 주요 증상은?**

- 인플루엔자**
고열, 기침, 인후통, 두통,
콧물, 설사(소아)
- 수두**
미열, 발진, 수포
- 유행성이하선염(볼거리)**
발열 이하선염,
이하선 주위 부종 및 통증

CH 카카오톡 채널 '대한민국 질병관리청' 친구 추가 3/7

2026.2.26. 질병관리청

이달의 건강소식 **봄철 새 학기 유행성 감염병**

☹️ **의심 증상 시, 주의해야 할 사항은?**

감염병 의심 증상이 발견되면
타인과 접촉을 자제하도록 주의가 필요합니다.

- 가까운 **의료기관 방문**
검사 및 진료받기
- 외출 시 **마스크 착용하기**
- 전염기가 지난 후에
등원, 등교하기

CH 카카오톡 채널 '대한민국 질병관리청' 친구 추가 4/7

2026.2.26. 질병관리청

이달의 건강소식 **봄철 새 학기 유행성 감염병**

😊 **언제까지 주의해야 할까요?**

- 인플루엔자**
해열제 없이도 해열이 된 후,
최소 24시간까지
- 수두**
모든 피부 병변에 가피(딱지)가
생길 때까지(발진 발생 후 최소 5일간)
- 유행성이하선염(볼거리)**
이하선염 발생 후 5일까지

*전염기가 지나 전염력이 소실될 때까지 격리하거나 주의 사항을 지켜야 합니다.

CH 카카오톡 채널 '대한민국 질병관리청' 친구 추가 5/7

2026.2.26. 질병관리청

이달의 건강소식 **봄철 새 학기 유행성 감염병**

😊 **꼭 챙겨야 할 예방접종은?**

손씻기, 기침예절 등 개인위생을 철저히 하고
특히 **수두와 볼거리 미접종자는**
예방접종을 반드시 해주세요!

감염병	예방법	예방접종 권장 횟수·시기
인플루엔자	IV 예방접종	매년 1회* (~4.30.) * 9세 미만 어린이가 인플루엔자 백신을 처음 접종한다면 2차 접종
수두	VAR 예방접종	총 1회 (생후 12~15개월)
유행성이하선염(볼거리) *종역, 풍진 동시 예방	MMR 예방접종	총 2회 (1차: 생후 12~15개월 / 2차: 4~6세)

CH 카카오톡 채널 '대한민국 질병관리청' 친구 추가 6/7