

호남권 감염병 주간 소식지

※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계



호남권 전체 감염병(2~3급) 현황

29주 호남권 감염병 발생 현황
(인구 10만 명당)

4.6 [전국 4.4]

총 259명 발생 전주(298명) 대비 ▼13.1%

전남광주통합특별시
(광주)

5.3



총 74명 발생
전주 대비
▼3.9%

전남광주통합특별시
(전남)

3.6



총 65명 발생
전주 대비
▼26.1%

전북특별자치도

4.5



총 78명 발생
전주 대비
▼27.8%

제주특별자치도

6.3



총 42명 발생
전주 대비
▲68.0%

전주 대비 증가¹⁾

· E형간염

- 전주(1명) 대비 400.0%(4명) 증가
* (25주) 4명 → (26주) 4명 → (27주) 2명 → (28주) 1명 → (29주) 5명

· 수두

- 전주(74명) 대비 10.8%(8명) 증가
* (25주) 131명 → (26주) 149명 → (27주) 102명 → (28주) 74명 → (29주) 82명

전년 대비 증가

· A형간염

- 전년(116명) 대비 51.7%(60명) 증가
* (19년) 458명 → (22년) 149명 → (24년) 102명 → (25년) 116명 → (26년) 176명

· 수두

- 전년(1,983명) 대비 51.6%(1,000명) 증가
* (19년) 6,406명 → (22년) 1,222명 → (24년) 3,336명 → (25년) 1,938명 → (26년) 2,938명

호남권 전수감시 현황

발생이 많은 감염병²⁾

CRE 93명

전주대비 감소

수두 82명

전주대비 증가

결핵 35명

전주대비 감소

최근 5주 발생 추이




누적 전국 대비 발생률이 높은 감염병³⁾

프프가무시증
2.9배

신증후군출혈열
2.4배

SFTS
2.3배

누적 발생률(인구 10만명당)



전국 표본감시 현황

표본감시 장관감염증 현황

장관감염증 환자 749명, 전주대비 증가
세균 59.7%, 바이러스 39.5%, 기타 0.8% 차지



세균⁴⁾

캠필로박터균	176(23.5%)
살모넬라균	122(16.3%)
장병원성대장균	122(16.3%)

바이러스⁴⁾

노로바이러스	106(14.2%)
장내 아데노바이러스	63(8.4%)
아스트로바이러스	44(5.9%)

캠필로박터균

전주 대비 26.6% 증가하였으며,
지속 증가 추세



살모넬라균

전주 대비 23.2% 증가하였으며,
지속 증가 추세



1) 전주 대비 증가 감염병: 발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병

2) 발생이 많은 감염병: 호남권 금주 발생이 많은 감염병 상위 3개 감염병

3) 전국대비 발생률이 높은 감염병: '26년 누적 전국 발생 수가 10명 초과 감염병 중 인구 10만명당 발생률이 전국 대비 호남권이 높은 상위 3개 감염병

4) 전국 표본감시 장관감염증 중 차지비율 높은 상위 3개 감염병

호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 29주차)

감염병	주간(2026.7.12.~2026.7.18.)												연간 누계(2025.12.28.~2026.7.18.)																
	전국		호남권		광주		전북		전남		제주		전국		호남권			광주			전북			전남			제주		
	29주	29주	28주	29주	28주	29주	28주	29주	28주	29주	28주	'26	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)		
결핵	222	35	36	6	8	10	8	15	17	4	3	7,770	1,062	1,048	1.3	185	159	16.4	341	356	△4.2	444	434	2.3	92	99	△7.1		
수두	568	82	74	23	24	22	22	11	18	26	10	20,246	2,938	1,938	51.6	699	469	49.0	1,066	469	127.3	616	738	△16.5	557	262	112.6		
홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	20	△95.0	0	8	△100.0	1	0	순증	0	10	△100.0	0	2	△100.0		
장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	순증	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	순증	0	0	-	1	0	순증	1	0	순증	0	0	-		
세균성 이질	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	7	△100.0	0	2	△100.0	0	3	△100.0	0	2	△100.0	0	0	-		
장출혈성 대장균감염증	7	2	4	0	1	0	0	2	2	0	1	294	45	35	28.6	14	17	△17.6	17	3	466.7	9	13	△30.8	5	2	150.0		
A형간염	22	4	7	0	0	2	5	0	1	2	1	1,003	176	116	51.7	30	19	57.9	104	52	100.0	25	28	△10.7	17	17	0.0		
백일해	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	225	23	638	△96.4	5	134	△96.3	5	151	△96.7	12	228	△94.7	1	125	△99.2		
유행성이하선염	126	11	15	3	3	1	5	4	5	3	2	3,120	363	443	△18.1	103	108	△4.6	100	120	△16.7	106	149	△28.9	54	66	△18.2		
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
수막구균	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	△50.0	0	2	△100.0	0	0	-	0	0	-	1	0	순증		
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
폐렴구균감염증	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	265	21	25	△16.0	5	5	0.0	5	4	25.0	6	12	△50.0	5	4	25.0		
성홍열	165	14	23	9	9	2	7	2	5	1	2	7,601	728	618	17.8	366	319	14.7	119	120	△0.8	183	116	57.8	60	63	△4.8		
VRSA†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-		
CRE†	976	93	114	29	27	36	53	23	30	5	4	29,469	2,782	2,458	13.2	747	698	7.0	1,145	884	29.5	708	681	4.0	182	195	△6.7		
E형간염	24	5	1	1	1	1	0	3	0	0	0	446	65	69	△5.8	16	16	0.0	16	27	△40.7	31	22	40.9	2	4	△50.0		
파상풍	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	4	2	100.0	0	0	-	1	2	△50.0	3	0	순증	0	0	-		
B형간염	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	133	20	22	△9.1	6	5	20.0	3	6	△50.0	10	10	0.0	1	1	0.0		
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
C형간염	62	4	8	2	1	0	3	1	3	1	1	2,872	399	496	△19.6	86	91	△5.5	84	110	△23.6	196	262	△25.2	33	33	0.0		
말라리아	14	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	203	5	7	△28.6	0	1	△100.0	2	1	100.0	3	5	△40.0	0	0	-		
레지오넬라증	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	405	38	28	35.7	1	4	△75.0	12	8	50.0	12	7	71.4	13	9	44.4		
비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-		
발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-		
쯔쯔가무시증	3	2	3	0	1	0	2	2	0	0	0	104	33	73	△54.8	1	3	△66.7	18	27	△33.3	12	38	△68.4	2	5	△60.0		
렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	7	△28.6	1	2	△50.0	2	2	0.0	2	3	△33.3	0	0	-		
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-		
신증후군출혈열	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	61	16	31	△48.4	3	4	△25.0	5	10	△50.0	8	16	△50.0	0	1	△100.0		
CJD,변종CJD†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	4	△75.0	0	1	△100.0	0	1	△100.0	0	2	△100.0	1	0	순증		
댕기열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	5	△80.0	0	0	-	0	1	△100.0	0	3	△100.0	1	1	0.0		
큐열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	5	3	66.7	0	0	-	3	0	순증	2	3	△33.3	0	0	-		
라임병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	1	0.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	1	0	순증		
치쿤구니아열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
SFTS†	2	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	64	16	24	△33.3	1	1	0.0	7	11	△36.4	3	3	0.0	5	9	△44.4		
지카바이러스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
매독	24	4	5	0	1	4	2	0	1	0	1	1,159	116	105	10.5	34	32	6.3	45	37	21.6	29	26	11.5	8	10	△20.0		
엡폭스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		

* 2급감염병, 3급감염병, 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

** 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외

† VRSA/VISA: 반코마이신(중등도)내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균목 감염증, CJD: 크로이츠펔트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군



여름방학, 사람유두종바이러스(HPV) 백신 접종받고 건강한 새학기 준비!

- 여름방학 맞이 남아 청소년 대상 HPV 백신접종 적극 권장
- 학기 중 시간 내기 어려운 청소년, 방학 기간 활용해 보건소 및 위탁의료기관에서 접종 가능

< HPV 국가예방접종 첫 접종 시기별 접종 횟수 및 간격 >

첫 접종 시기	백신	필요 접종 횟수	접종 간격
14세까지 (15세가 되는 생일 전날까지)	HPV 4가	2회	- 2차: 첫 접종 6개월 후
15세부터 (15세가 되는 생일 이후부터)		3회	- 2차: 첫 접종 2개월 후 - 3차: 첫 접종 6개월 후



QR코드로 현장에서 바로 확인하는 「법정감염병 진단검사 통합지침」 개정 발간

- 「법정감염병 진단검사 통합지침」 제5판 전면 개정·배포
- QR코드 하나로 스마트폰에서 언제 어디서나 확인



법정감염병 진단검사 통합지침

「전 세계 감염병 동향 제26호(2026.7.16.)」 질병관리청 감염병포털> 감염병소식> 주간발생동향



🌐 (크리미안콩고출혈열, 다국가) '26년 11개 국가(동지중해 지역 중심)에서 크리미안콩고출혈열 관련 사례 1,473명(사망 78명) 이상 발생 ※ 「전 세계 감염병 발생 동향」 15호('26.4.23.) 관련 업데이트

- '26.7.14. 기준 전 세계 11개 국가에서 크리미안콩고출혈열 의심 또는 확진 사례가 최소 1,473명(사망 78명 이상) 발생하였으며, 동지중해 지역 중심으로 발생이 보고됨
- 국내 크리미안콩고출혈열 발생 및 해외유입 사례 보고 없음. 다만, 유행 지역(중동·아프리카 등) 여행 시 진드기 물림 주의 등 예방수칙을 준수하여 감염을 예방하는 것이 중요함. 유행 지역 방문 후 발열 및 기타 출혈열 관련 증상 이 있을 경우, 질병관리청콜센터(1339) 또는 보건소로 문의를 권고함 * 발열과 오한, 권태감, 두통, 전신 근육통·관절통, 오심, 구토, 설사 등

🌐 (피부 리슈만편모충증, 멕시코) '26년 멕시코에서 피부 리슈만편모충증 사례 400명 보고되어 '25년 동 기간 대비 4배 증가

- '26년(~6.27.) 멕시코에서 남동부 지역 중심으로 피부 리슈만편모충증 사례 400명 발생이 보고되었고 '25년 동 기간(101명) 대비 4배 증가함
- 국내에는 매개체인 모래파리가 토착 분포하지 않으나 해외유입 감염병의 발생 위험이 높아지고 있어 여행객들의 주의가 필요
- 피부 리슈만편모충증 유행 지역 방문 시 모래파리 활동 시간대인 야간에 외부 활동을 자제하고, 긴 옷으로 노출을 최소화하며, 노출된 피부에는 곤충기피제 사용 등 주의가 필요함


🌐 (원포자충 감염증, 미국) '26년 미국 내 원포자충 감염증이 미시간주(3,762명, 7.15.기준)·오하이오주(364명, 7.10.기준)에서 전년(미시간주 50명, 오하이오주 75명) 대비 급격히 증가, 7월 현재 34개 주에서 발생 보고

- '26년 미국 미시간주에서 원포자충 감염증(Cyclosporiasis) 환자 총 3,762명(입원 44명)이 보고됐으며, '24년(41명), '25년(50명) 연간 보고건수를 크게 상회함. 오하이오주에서도 환자 총 364명(입원 46명)이 보고됐으며, '24년(80명), '25년(75명) 연간 보고건수를 초과하여 발생함. 미시간주는 양상추나 샐러드 채소가 잠재적 원인일 가능성이 높은 것으로 보고 보건당국이 인접 주 및 연방기관과 함께 감염원인을 조사 중임
- 국내 '26년(29주 기준) 원포자충 감염증 누적 신고 환자수는 2명임. 원포자충 감염증 예방을 위해 수칙(올바른 손씻기 생활화 (30초 이상), 음식 충분히 익혀먹기, 물 끓여 마시기 등)을 준수할 것을 당부하며, 장기간 지속되는 수양성 설사 등 증상이 있을 시 즉시 의료기관 방문 및 진료받을 것을 권고함

□ 전주 대비 증가(발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)


○ (E형간염) 29주 총 5명 발생하였으며, 전주(1명) 대비 ▲400.0%(4명) 증가, '26년 누적 총 65명으로 전년(69명) 대비 ▼5.8%(4명) 감소

- 전남 3명, 광주 1명, 전북 1명 발생하였으며, 제주 발생 없음



○ (수두) 29주 총 82명 발생하였으며, 전주(74명) 대비 ▲10.8%(8명) 증가, '26년 누적 총 2,938명으로 전년(1,938명) 대비 ▲51.6%(1,000명) 증가

- 제주 26명, 광주 23명, 전북 22명, 전남 11명 순으로 발생



□ 전년 동기간 대비 증가(전년 동기간 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)

○ (A형간염) '26년 누적 총 176명 발생 전년(116명) 대비 ▲51.7%(60명) 증가

* ('19년)458명→('22년)149명→('24년)102명→('25년)116명→('26년)176명

○ (수두) '26년 누적 총 2,938명 발생, 전년(1,938명) 대비 ▲51.6%(1,000명) 증가

* ('19년)6,406명→('22년)1,222명→('24년)3,336명→('25년)1,938명→('26년)2,938명

□ 인구 10만명당 발생률(전국대비 누적 발생률이 높은 상위 3개 감염병)

○ 췌장암무시증^{2.8배}, 신증후군출혈열^{2.5배}, SFTS^{2.2배} 전국대비 발생률 높음

< 전국·호남권 주요 감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-29주) >


감염병	전국	호남권	광주	전북	전남	제주
결핵	15.19	19.02	13.21	19.69	24.89	13.78
수두	39.57	52.62	49.92	61.56	34.53	83.44
유행성이하선염	6.10	6.50	7.36	5.77	5.94	8.09
성홍열	14.86	13.04	26.14	6.87	10.26	8.99
CRE	57.59	49.82	53.35	66.12	39.69	27.26
A형간염	1.96	3.15	2.14	6.01	1.40	2.55
췌장암무시증	0.20	0.59	0.07	1.04	0.67	0.30
신증후군출혈열	0.12	0.29	0.21	0.29	0.45	0.00
SFTS	0.13	0.29	0.07	0.40	0.17	0.75
장출혈성대장균	0.57	0.81	1.00	0.98	0.50	0.75
C형간염	5.61	7.15	6.14	4.85	10.99	4.94

□ 주요 감염병 발생 현황

○ 29주 CRE 93명, 수두 82명, 결핵 35명 순으로 발생



○ 주요 감염병 발생 추이



□ 전국 장관감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 210개

- (장관감염증 현황) 신고환자 총 749명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 59.7%, 바이러스 39.5% 차지


< 최근 10주간 장관감염증 신고현황 >

(단위: 명(%))

구분	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주
전 체	735	676	637	690	833	737	687	708	743	749
세 균	299 (40.7)	249 (36.8)	242 (38.0)	334 (48.4)	438 (52.6)	370 (50.2)	362 (52.7)	365 (51.6)	389 (52.4)	447 (59.7)
바이러스	432 (58.8)	423 (62.6)	387 (60.8)	352 (51.0)	390 (46.8)	364 (49.4)	319 (46.4)	338 (47.7)	350 (47.1)	296 (39.5)
기타(원충)	4 (0.5)	4 (0.6)	8 (1.3)	4 (0.6)	5 (0.6)	3 (0.4)	6 (0.9)	5 (0.7)	4 (0.5)	6 (0.8)

- (세균성) △캄필로박터균 176명, 전주 대비 26.6%(37명) 증가, △장병원성대장균(EPEC) 122명 전주 대비 4.7%(6명) 감소 △살모넬라균 122명, 전주 대비 23.2%(23명) 증가 순

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- (바이러스성) △노로바이러스 106명으로 지속 감소 추세 지속, △장내 아데노 바이러스 63명, △아스트로바이러스 44명 순

전국 바이러스성 장관감염증 신고현황



□ **전국 급성호흡기감염증 입원환자 감시**

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 223개

- **(급성호흡기감염증 현황)** 입원환자 총 999명으로 전주 대비 감소하였으며, 세균 2.8%(28명), 바이러스 97.2%(971명) 차지

<병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황>

(단위: 명)

구분	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주
전체	1,605	1,665	1,364	1,262	1,289	1,140	1,132	1,111	1,145	999
세균	24	24	21	27	26	15	19	23	31	28
바이러스	1,581	1,641	1,343	1,235	1,263	1,125	1,113	1,088	1,114	971

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함


- **(세균성)** 마이코플라스마 폐렴균 24명(85.7%), 클라미디아 폐렴균 4명(14.3%) 발생

전국 병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



- **(바이러스성)** 파라인플루엔자 바이러스 386명(39.8%), 리노바이러스 292명(30.1%), 사람 메타뉴모바이러스 93명(9.6%) 등의 순

전국 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



□ **전국 수족구병 환자감시**

※ 표본감시기관: (의원급) 전국 93개

- **(의사환자분율)** 수족구병 의사환자분율 31.4명(/1,000명당)으로 전주(26.4명) 대비 증가하였으며, 연령별 발생 현황으로는 0-6세 43.8명, 7-18세 5.9명

전국 연도별·주별 수족구병 의사환자분율



전국 '26년 연령별 주별 수족구병 의사환자분율

